

服用の際に、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

# 総合感冒薬 ラモンドールII<sup>®</sup>

ラモンドールIIは解熱鎮痛成分アセトアミノフェンやつらい鼻症状やせきを抑える成分がバランスよく配合されているかぜ薬で、中身が溶けやすい液状のソフトカプセルです。



## 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります)

#### 4. 服用前後は飲酒しないでください。

#### 5. 長期連用しないでください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人は。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、

胃・十二指腸潰瘍、線内障



#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

※裏面も必ずお読みください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
せんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15歳以上	7歳以上15歳未満	7歳未満
1回量	2カプセル	1カプセル	服用しないでください

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります）



## 成分・分量 1日量（6カプセル）中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛や筋肉・関節・のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を拡げ、せきをしのぎ、たんを出しやすくします。
無水カフェイン	50mg	頭痛をやわらげるとともに、他の薬の効果を高めます。

添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、無水ケイ酸、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になつたり品質が変わってしまいます）
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先 中央薬品株式会社  
お客様相談窓口 電話 076-493-5010  
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元 スパリ

中央薬品株式会社  
富山県富山市西四十物町4-9