

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃の痛み・もたれに

第2類医薬品

胃腸薬エースプラス

胃腸薬

〔特徴〕

- 胃腸薬エースプラスは、胃腸の不快感にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分を配合した飲みやすい細粒状の複合胃腸薬です。
- 4種類の制酸成分の組み合わせにより、胃痛や胸やけなどの過酸症状を改善します。
- 胃腸機能を調整するカルニチン塩化物をはじめ、5種類の生薬が弱った胃の働きを高め、胃部膨満感、胃もたれ等に効果をします。
また、アカメガシワ末が乱れた腸の働きを整えます。
- でんぷん、たんぱく質、脂肪それぞれの消化酵素を配合しています。
- 胃粘膜修復剤が荒れた胃粘膜の修復を助けます。
- アルミニウムを含まない制酸剤を配合しています。(アルミニウムフリー)



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して、乳児の脈が速くなることがある。)



相談すること

- 1.次の方は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、消化促進

【用法・用量】

次の量を食後に、水又はお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上（成人）	1包	3回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
8歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
5歳～7歳	$\frac{1}{3}$ 包	
5歳未満	服用しないこと	



【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 成人1日量3包(1.4g×3包)中

成分	分量	はたらき	
炭酸水素ナトリウム	800mg	過剰な胃酸をすばやく中和し、胃痛、胸やけ、むかつきなどの胃の不快感な症状を改善します。	
沈降炭酸カルシウム	800mg		
炭酸マグネシウム	500mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを和らげます。	
ロートエキス3倍散	90mg		
ケイヒ末	300mg		生薬特有の味と香りにより、胃腸の働きを活発にし、食欲不振、消化不良、飲み過ぎによる不快な症状を改善します。
チヨウジ末	50mg		
ゲンチアナ末	50mg		
ガジュツ末	50mg		
ニンジン末	100mg	胃腸の働きを活発にします。	
カルニチン塩化物	200mg		
ピオチアスターゼ	60mg	でんぶん、たんぱく質、脂肪の三大栄養素の消化を助けます。	
プロザイム	20mg		
リパーゼAP6	60mg		
アカメガシワ末	300mg	乱れた腸の働きを整えます。	
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	荒れた胃粘膜の修復を助けます。	

添加物として、センブリ末、グリチルリチン酸、ハッカ油、*l*-メントール、D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイシヨデンプン、デキストリンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



【包装】

1包1.4g 20包入り

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

胃のもたれ・むかつき・痛み

胃腸薬エースプラス

胃腸薬

〔特徴〕

- 胃腸薬エースプラスは、胃腸の不快感にすぐれた効果を発揮するように、それぞれの有効成分を配合した飲みやすい細粒状の複合胃腸薬です。
- 4種類の制酸成分の組み合わせにより、胃痛や胸やけなどの過酸症状を改善します。
- 胃腸機能を調整するカルニチン塩化物をはじめ、5種類の生薬が弱った胃の働きを高め、胃部膨満感、胃もたれ等に効果をします。
また、アカメガシワ末が乱れた腸の働きを整えます。
- でんぷん、たんぱく質、脂肪それぞれの消化酵素を配合しています。
- 胃粘膜修復剤が荒れた胃粘膜の修復を助けます。
- アルミニウムを含まない制酸剤を配合しています。(アルミニウムフリー)



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

(母乳に移行して、乳児の脈が速くなることがある。)



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることがある。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、消化促進

【用法・用量】

次の量を食後に、水又はお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上（成人）	1包	3回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
8歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
5歳～7歳	$\frac{1}{3}$ 包	
5歳未満	服用しないこと	



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】

成人1日量3包(1.4g×3包)中

成分	分量	はたらき
炭酸水素ナトリウム	800mg	過剰な胃酸をすばやく中和し、胃痛、胸やけ、むかつきなどの胃の不快感を改善します。
沈降炭酸カルシウム	800mg	
炭酸マグネシウム	500mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを和らげます。
ロートエキス3倍散	90mg	
ケイヒ末	300mg	生薬特有の味と香りにより、胃腸の働きを活発にし、食欲不振、消化不良、飲み過ぎによる不快感を改善します。
チヨウジ末	50mg	
ゲンチアナ末	50mg	
ガジュツ末	50mg	
ニンジン末	100mg	胃腸の働きを活発にします。
カルニチン塩化物	200mg	
ピオチアスターゼ	60mg	でんぷん、たんぱく質、脂肪の三大栄養素の消化を助けます。
プロザイム	20mg	
リパーゼAP6	60mg	乱れた腸の働きを整えます。
アカメガシワ末	300mg	
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	荒れた胃粘膜の修復を助けます。

添加物として、センブリ末、グリチルリチン酸、ハッカ油、*l*-メントール、D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、パレイシヨデンプン、デキストリンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内で服用すること。



【包装】

1包1.4g 16包入り

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区神田3-6-2アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）