

2013年1月（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目薬

第一ゴールド目薬

第2類医薬品

第一ゴールド目薬は、目の炎症をしずめて充血やかゆみなどの症状を改善したり、目の疲れをとる働きがあります。ほこりっぽい場所で作業した後の目のかゆみ・かすみ、目を酷使したときの疲れ目などにおすすめます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 目のかすみが改善されない場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（裏面もお読みください。）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴ずつを点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

100mL中

| 成分 | 分量 |
|-----------------|-------|
| ナファゾリン塩酸塩 | 3mg |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 2mg |
| アラントイン | 100mg |
| グリチルリチン酸二カリウム | 100mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 10mg |
| ピリドキシン塩酸塩 | 100mg |

添加物としてホウ酸、ホウ酸Na、ベンザルコニウム塩化物、pH調整剤、l-メントール、d-カンフル、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは使用しないでください。また、表示の期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

■お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1

NP-BL-8