

肩こり 腰痛 関節痛 ハイコリマン

第3類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の部位には使用しないこと
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。

⚑ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、骨折痛、しもやけ

用法・用量

薬面上のフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付する。

（用法・用量に関する注意）

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用せること。

- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。

成分・分量

1m²中
l-メントール……11.0g /ニル酸ワニルアミド…0.01g
サリチル酸グリコール…7.0g 添加物としてスチレン・イソブレン・スチレンブロックポリマー、酸化亜鉛、ポリイソブレン、ポリブテン、BHT、その他1成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

- (2)小児の手の届かない所に保管すること。

- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になつたり品質が変わる。）。

- (4)表示の期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

20枚入 (1枚10cm×6cm)

発売元 第一薬品工業株式会社
富山市草島15-1

品目番号 奈17-55

製造販売元 株式会社 吉田養真堂
奈良県橿原市南八木町3丁目8-22

くすり相談窓口:(0744)22-2374
9:00~16:30(土、日、祝日を除く)