

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬

カゼゴールドK顆粒

第②類医薬品

カゼゴールドK顆粒は、発熱、頭痛などのかぜの症状に効果のある漢方薬「桂枝湯」のエキスに加えて、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩などのかぜの諸症状を緩和する成分を配合したかぜぐすりです。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期運用しないでください

▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中のの人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (7)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、線内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝 機 能 障 害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎 障 害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間 質 性 肺 炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |

(裏面もお読みください。)

| | |
|---------|---|
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。なるべく温湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|----------|--------|
| 成人(15才以上) | 1包 | 3回 |
| 11才以上15才未満 | 2/3包 | |
| 7才以上11才未満 | 1/2包 | |
| 3才以上 7才未満 | 1/3包 | |
| 1才以上 3才未満 | 1/4包 | |
| 1才未満 | 服用させないこと | |

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量 3包(成人1日量)中

(1包:1.4g)

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|---|-------|---|
| 桂枝湯エキス (ケイヒ 0.8g シャクヤク 0.8g) (タインウ 0.8g カンゾウ 0.4g) (ショウキョウ 0.2g) | 600mg | かぜ薬として用いられてきた桂枝湯をエキスにしたもので、発熱、悪寒、頭痛、筋肉の痛みなどをやわらげます。 |
| アセトアミノフェン | 900mg | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | 鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をやわらげます。 |
| チベピジンヒベンズ酸塩 | 75mg | 非麻薬性の鎮咳去痰薬で、せきをしづめ、たんを出しやすくします。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | 気管支をひろげ、せきをしづめます。 |
| 無水カフェイン | 75mg | 熱を下げ痛みをやわらげる成分のはたらきを補助します。 |
| リボフラビン | 6mg | かぜの際に不足しがちなビタミンB2を補給します。 |

添加物としてD-マンニトール、ケイ酸Al、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステビア抽出物、クロスボビドン、カルメロースCa、ラウリル硫酸Na、乳糖、カラメル、ヒドロキシプロビルセルロース、クロスカルメロースNa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ケイヒ油、香料、ビタミンEを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口:電話 076-435-5055 午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1

NK・JK

4030030123-2