



【使用上の注意】 **相談すること** しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】 成人(15才以上)1日1回、1瓶(50mL)を服用する。●用法・用量を厳守すること。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること) ●生薬成分を配合しているので、まれに沈殿を生じることがある。効果には変わらないので、よく振って服用すること。

【成分・分量】 1瓶(50mL)中 リボフラビンリン酸エステルナトリウム12mg・ピリドキシン塩酸塩10mg・ニコチン酸アミド40mg・タウリン1000mg・グリシン35mg・グルコン酸カルシウム水和物400mg・カフェイン水和物50mg・ヨクイニンエキス76.9mg(ヨクイニンとして1000mg)・ローヤルゼリーチンキ100mg(ローヤルゼリーとして100mg)(アルコール0.2mL以下) 添加物としてDL-リンゴ酸、クエン酸Na、エリスリトール、ハチミツ、果糖、ステビア抽出物、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、バラベン、クエン酸、カラメル、香料 ●本剤の服用により、尿が黄色くなることもあるが、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)表示の期限を過ぎたものは服用しないこと。

SG-3

使用期限
(西暦 年.月)
製造番号

肉體疲労時の 栄養補給、 滋養強壮に

くすり相談窓口
☎ 076-435-5055



ガラス:びん
金属:キャップ