

天然型ビタミンE・C配合

ハイEC**第3類医薬品****特 長**

ビタミンEは、血行をよくし、肩や首すじのこり、手足のしびれや冷え、しもやけを緩和します。また、体内で脂肪が酸化されてできる過酸化脂質の増加を防ぎ、色素沈着を緩和します。

ビタミンCは、細胞と細胞を結びつけるたんぱく質(コラーゲン)の生成に関与し、血管壁を丈夫にします。また、メラニン色素の生成をおさえ、しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着を緩和します。

**使用上の注意****相談すること**

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

◇効能又は効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

◇用法及び用量

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	1～3回
11歳以上15歳未満	1カプセル	2～3回
7歳以上11歳未満	1カプセル	1～3回
7歳未満	服用しないこと	

1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用する。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

◇成分及び分量

6カプセル中

酢酸d- α -トコフェロール…………… 300mg

アスコルビン酸……………600mg

添加物としてサラシミツロウ、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、グリセリン、エチルパラベン、プロピルパラベン、酸化チタン、赤色102号、青色1号、ポリソルベート80を含有する。

◇保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わりませう。）
- (4) 期限をすぎた製品は服用しないでください。



お客様相談窓口 TEL 076-476-1111

9:00～16:30（土、日、祝祭日は除きます。）



製造販売元

明治製薬株式会社

富山県滑川市の中川原7番地