

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**第②類医薬品**

かぜ薬

# かぜ薬 トビックGX

解熱作用がある生薬（地竜、牛黄）とアセトアミノフェンの働きで発熱や頭痛、関節の痛みを和らげます。また、去痰作用がある生薬（キキョウ）とチペピジンクエン酸塩を配合しています。この他にも、かぜの諸症状に適した成分をバランス良く配合しています。

## ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
 （眠気等があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (6) 次の症状のある人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高熱、排尿困難  
 (3) 授乳中の人。 (7) 次の診断を受けた人。  
 (4) 高齢者。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、  
 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたこと 高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二  
 指腸潰瘍、緑内障  
 がある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

裏面も必ずお読みください

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

#### 【用法・用量】


年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回 食後なるべく30分以内に服用してください。
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満の小児	服用しないでください。	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)

(PTPシートの取り出し図)



#### 【成分と作用】

6カプセル(成人1日量)中に次の成分を含有しています。

成 分	分量	作 用
アセトアミノフェン	675 mg	解熱効果が優れ、発熱や頭痛、関節の痛みをやわらげます。
地竜乾燥エキス (原生薬換算量)	90 mg (693 mg)	
牛黄	3 mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg	かぜの初期のアレルギー症状の鼻水、鼻づまりなどいやな症状を改善します。
無水カフェイン	60 mg	脳の血管にはたらいで、頭痛をしずめます。
チペピジンクエン酸塩	60 mg	延髄の咳中枢に作用して、せきを止め、気道粘膜線毛上皮運動を促進してたんをよく排出します。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
桔梗乾燥エキス末 (原生薬換算量)	120 mg (600 mg)	気道のたんをうすめるとともに排出作用が優れています。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、青色1号、赤色3号、黄色5号、亜硫酸水素ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

**日新薬品工業株式会社 お客様相談室**  
 〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1  
 ☎ 0120-415-688  
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931  
 製造販売元 **日新薬品工業株式会社** 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1