

第3類医薬品

声がれ、口臭の除去  
のどのはれ、痛み

炎症をおさえる成分

アズレンスルホン酸ナトリウム  
グリチルリチン酸二カリウム

配合

トピックAZトローチ



# トピックAZトローチ

第3類医薬品

使用に際しては、説明書をよくお読みください。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合  
は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください


【効能・効果】●のどの炎症による声がれ・のどのあれ・  
のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ  
●口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【用法・用量】次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっ  
くり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1錠	4～6回
5歳以上15歳未満		2～3回
5歳未満	使用しないでください	

## 【用法及び用量に関連する注意】

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。(4) 本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。(5) トローチ剤の取り出し方  
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】1錠(1.2g)中に次の成分を含有しています。

アズレンスルホン酸ナトリウム……0.8mg  
グリチルリチン酸二カリウム……2.5mg  
セチルピリジニウム塩化物水和物……1mg  
添加物：精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ポビドン、マクロゴール6000、炭酸水素ナトリウム、l-メントール、ステアリン酸カルシウム、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、香料

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) アルミ袋を開封し、日数を経ると、光や熱、湿気により変色することがあります。ご使用の残りは保管方法に注意し、変色したものは使用しないでください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 本剤に添加されているl-メントールが、温度変化等により綿状又は繊維状に析出する場合がありますが、品質には問題ありません。

製造販売元 日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

お問い合わせ先 ☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931