

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

セキポンS



使用上の注意



**してはいけないこと** (守らないと現在の症状  
が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用  
しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒス  
タミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い  
薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気があらわれることがあります。)



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠して  
いると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 本人又  
は家族がアレルギー体質の人 (6) 薬によりアレルギー  
症状を起こしたことがある人 (7) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人 心臓病、高  
血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って  
医師又は薬剤師に相談してください。  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の  
継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医  
師又は薬剤師に相談してください。便秘、口のかわき

裏面もお読みください。

【効能・効果】 せき、たん

【用法・用量】 次の量を1日3回服用してください。

年 齢	1 回 量	年 齢	1 回 量
大人(15歳以上)	1 包	5歳以上8歳未満	1/3包
11歳以上15歳未満	2/3包	3歳以上5歳未満	1/4包
8歳以上11歳未満	1/2包	3歳未満	服用しないでください

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量(3包)中

リン酸ジヒドロコデイン	30mg
d1-塩酸メチルエフェドリン	75mg
マレイン酸クロルフェニラミン	12mg
無水カフェイン	150mg
麦門冬乾燥エキス	200mg
(原生薬換算量：1000mg)	

添加物として、HPC、CMC-Ca、合成ケイ酸Al、バレイシヨデンプン、黄色5号を含有します。

<保管及び取扱い上の注意>

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の切り口を折り返して、2日以内に服用してください。

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

美吉野製薬株式会社「お客様相談係」

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692

電 話 (0745)67-0144(代)

製造販売元

美吉野製薬株式会社  
奈良県吉野郡大淀町大岩692

0508SA