



この説明文書は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください

解熱鎮痛薬

# はれやかさ

第2類医薬品

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvensジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

(裏面もお読みください。)

ぜんそく

息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等  
があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 成分及び分量 1日量(2包)中

アセトアミノフェン……………600.0mg  
エテンザミド……………1,000.0mg  
アリルイソプロピルアセチル尿素……………100.0mg  
無水カフェイン…………… 80.0mg  
添加物として、カルメロースカルシウム、カンゾウ末、白糖、果糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、アマチャ末、*d*-ボルネオール、*l*-メントールを含有します。

#### 効能又は効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

#### 用法及び用量

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。ただし、服用間隔は6時間以上おいてください。

15歳以上	1回	1包
11歳以上15歳未満	1回	2/3包
7歳以上11歳未満	1回	1/2包
3歳以上7歳未満	1回	1/3包
1歳以上3歳未満	1回	1/4包
1歳未満		服用しないこと

#### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります.)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話:076-479-1313  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

#### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)