

インドメシートID

第2類医薬品 (鎮痛消炎薬)

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと。

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限

ロット番号

成分及び分量 膏体100g中 インドメタシン0.500g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、セラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、l-メントール、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアミニウム アミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ソルピタン、黄色5号を含有します。

効能又は効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法及び用量

膏体面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるので、使用を控えてください。
- (6) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- (7) 貼付後、はがす際にまれに粘着シートと膏体部分とが分離する場合がありますが、効果に影響はありません。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話:076-479-1313 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元  大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

4枚入(11.8cm×7.5cm)
¥600+税 PP



〔切り取り線〕残りの薬が乾燥しないように、折り曲げて保管してください。