

# 発熱性消耗性疾患時の栄養補給 滋養強壮・虚弱体質

## ピテンリン内服液 30mL



第3類医薬品

製造販売元



### 大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土,日,祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

¥400+税

T12

### ビタミン含有保健薬

#### 使用上の注意

#### 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 効能又は効果

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**用法及び用量** 大人は1本30mLを1日1回服用してください。

**〈用法及び用量に関連する注意〉** 用法及び用量を厳守してください。

**成分及び分量** 1びん(30mL)中

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…3.0mg、ピリドキシン塩酸塩…10.0mg、ニコチン酸アミド…20.0mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)…500.0mg、ゴオウチンキ…0.5mL(原生薬換算量5mg)、ニンジン流エキス…0.8mL(原生薬換算量800mg)、ローヤルゼリー…50.0mg

添加物として、精製白糖、果糖、エタノール、dl-リンゴ酸、酒石酸、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、カルメロースナトリウム、バニリン、エチルバニリン、香料を含有します。(アルコール0.7mL以下)

**〈成分及び分量に関連する注意〉**

本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色くなることがあります。

#### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。).(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)生薬成分が沈殿することがありますが、そのまま振って服用して差し支えありません。

製造番号

使用期限