

この説明文書は本剤とともに保管し，服用の際には必ずお読みください

鎮咳去痰薬

セキピタール

第2類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬，かぜ薬，鎮静薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等）
3. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。高熱，排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。心臓病，高血圧，糖尿病，緑内障，甲状腺機能障害，てんかん，呼吸機能障害，閉塞性睡眠時無呼吸症候群，肥満症

2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ	消化器	吐き気・嘔吐，食欲不振
精神神経系	めまい	循環器	動悸
泌尿器	排尿困難		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。

(必ず裏面もお読みください)

呼吸抑制

息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 1日量（3包）中

ジヒドロコデインリン酸塩……………	30.0mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩……………	12.0mg
ノスカピン……………	60.0mg	ジブロフィリン……………	100.0mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………	50.0mg	グアヤコールスルホン酸カリウム……………	270.0mg

添加物として、D-マンニトール、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、結晶セルロース、バレイシヨデンブ、カルメロースナトリウム、グリチルリチン酸二カリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有します。

効能又は効果
たん、せき

用法及び用量 1日3回食後に服用してください

15歳以上……………1回1包

12歳以上15歳未満……………1回2/3包

12歳未満……………服用しないこと

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話：076-479-1313

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931