

販売名：リキポリン3000

〔成分・分量〕(100mL中)

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…5mg、ピロドキシリン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…25mg、無水カフェイン…50mg、タウリン…3000mg、L-アスパラギン酸カリウム…100mg、L-アスパラギン酸マグネシウム…100mg

添加物：安息香酸Na、パラベン、クエン酸、白糖、エタノール、pH調整剤2成分、香料

◎本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなる場合があります。

〔効能・効果〕

○滋養強壮○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

大人(15才以上)1日1回1びん(100mL)服用

◎用法・用量を厳守してください。
(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)

ガラス：びん 金属：キャップ

B

T-280

指定医薬部外品 滋養強壮・栄養補給

リキポリン[®]3000

100mL

タウリン
3000mg
配合

ビタミンB₂・B₆配合

製造販売元  テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

〔使用上の注意〕

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。医師の治療を受けている人。(腎臓疾患で電解質の摂取制限を受けている人など) 2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。(1)発疹、悪心・嘔吐、胃部不快感、軟便・下痢、便秘などの症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4. 使用期限の過ぎた製品は、服用しないでください。

お客様相談係 076-431-8863 [テイカ製薬(株)]

使用期限
(西暦年月)

製造番号

