

2011年10月
(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

目のつかれ、目のかすみに

目薬

®
バラードE50

ビタミンE・イップシロン-アミノカプロン酸配合

バラードE50の特徴

バラードE50は、天然型ビタミンEを配合した目薬で、目に栄養を補給し、衰えた目の機能を回復させます。働き盛りの方や目を酷使する仕事をされている方に起こりがちな「目のつかれ」、「目のかすみ」等の症状に効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

1.次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

使用法

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。

成 分・分 量

成 分	分 量 (100mL中)	はたらき
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	血行促進作用により、目の疲れを改善します。
イップシロン-アミノカプロン酸	1000mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線による眼炎や眼瞼炎の炎症をしずめ、目のかゆみをおさえます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	角膜の乾燥を防止し、目のうるおいを保ちます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	3mg	毛様体筋に作用し、目の調節機能を高め、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症をおさえます。
ナファザリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、目の充血を改善します。

添加物: ホウ酸、クエン酸、パラベン、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40°C以上)の所に置かないで下さい。
(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daichi-Sanryo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10