

二日酔いのむかつき・
飲み過ぎ・食べ過ぎなどに

健胃生薬配合製剤

イナルシン 胃腸内服液

第3類医薬品

9種類の健胃生薬
カルニチン塩化物

常盤薬品
NOEVIR GROUP

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

イナルシン胃腸内服液(健胃薬)

使用上の注意[相談すること] 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/医師の治療を受けている人。2.2週間位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量 1日量[60mL(30mL×2びん)]中 ケイヒエキス24.3mg(原生薬換算量540mg)、ゲンチアナ流工エキス0.5mL(原生薬換算量500mg)、ウイキョウ流工エキス0.216mL(原生薬換算量216mg)、ショウキョウ流工エキス0.216mL(原生薬換算量216mg)、キシツエキス100mg(原生薬換算量500mg)、カンソウエキス150mg(原生薬換算量600mg)、オウバクエキス100mg(原生薬換算量330mg)、オウレン流工エキス0.2mL(原生薬換算量200mg)、ニンジン流工エキス1.2mL(原生薬換算量1,200mg)、カルニチン塩化物120mg 添加物:液糖、トメントール、pH調節剤(クエン酸、炭酸水素Na)、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、香料(アルコール0.2mL以下/1びん(30mL)中) 効能・効果 食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心、嘔吐 用法・用量 成人(15才以上)1回1びん(30mL)を、1日2回食前に服用すること。ただし、1回目と2回目の服用間隔は、4時間以上おくと。

●用法・用量を守ること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(服用の原因によって品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

金属:キャップ ガラス:びん

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白檉字永谷2604-5
090202
30mL 400円(税別) TMYE905

お問い合わせは0120-875-710まで
副作用被害救済制度 0120-149-931

配置期限

製造番号

