

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

第2類医薬品

救 風(かぜ薬)

かぜの諸症状には、発熱、悪寒、頭痛、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛みがあります。救風は、これらの症状に効果がある漢方処方である葛根湯を主成分とし、さらに非ピリン系解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤などを配合した総合かぜ薬です。かぜの初期症状や、関節・筋肉の痛みに効果をあらわします。

特長

- 漢方処方「葛根湯乾燥エキス」を配合
- 「漢方薬+西洋薬」の漢洋ミックス処方
- かぜのひきはじめに効果的

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気などがあらわれることがあります。）

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌 尿 器 | 排尿困難 |
| そ の 他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤などが持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。 |

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|--|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



用法・用量

食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|---------------|--------|
| 成人(15才以上) | 1 包 | 3回 |
| 11才以上15才未満 | 2/3包 | |
| 7才以上11才未満 | 1/2包 | |
| 3才以上7才未満 | 1/3包 | |
| 3才未満 | ✕ 服用しないでください。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(3包)中 1包1,550mg

| 成 分 | 分 量 | は た ら き | |
|--------------------------|---------|---|-------|
| 葛根湯乾燥エキス (原生薬換算量9.0g) | 1,500mg | 漢方処方的一种で、7種類の生薬の組み合わせにより、かぜの初期症状に効果をあらわします。 | |
| カッコン | | | 2.88g |
| マオウ | | | 1.44g |
| ショウキョウ | | | 0.36g |
| タイソウ | | | 1.44g |
| ケイヒ | | | 1.08g |
| シャクヤク | | | 1.08g |
| カンゾウ | 0.72g | | |
| 計 | 9.0g | | |
| エテンザミド | 960mg | 熱や痛みの中枢に作用して、解熱・鎮痛効果をあらわします。非ピリン系。 | |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | 抗ヒスタミン作用により、鼻みず、鼻づまり、くしゃみなどをおさえます。 | |
| チペピジンヒベンズ酸塩 | 60mg | せきをしずめ、たんを出しやすくします。 | |
| 無水カフェイン | 150mg | 痛みをやわらげ、熱を下げる働きを助けます。 | |

添加物：乳糖、パレイシヨデンポン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース

〈保管および取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白樫字永谷2604-5