

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ノーリツZ DX(滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ：発疹/消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中
ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カフェイン50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン10mg、タウリン3,000mg、ケイヒ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、トウキ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(バニリン、エチルバニリン、エタノール、プロピレングリコール、フェノール類)(アルコール0.2mL以下) ●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。 効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉體疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

タウリン3000mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン
ケイヒ流エキス・トウキ流エキス
ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)

滋養強壮、虚弱体質
肉體疲労時の栄養補給

ノーリツZ
DX

第3類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

100mL 260円(税別)

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白樫字永谷2604-5

お問い合わせは0120-875-710まで

副作用被害救済制度0120-149-931

金属：キャップ 使用期限
ガラス：びん

製造番号

002520
ALI802

