



第2類
医薬品

赤玉へ

非ピリン系

かぜねつ
一効散

製造販売元 富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬175



品目番号 S55-94-93

成分・分量 1日量(3包中)

アセトアミノフェン	450mg
サリチルアミド	1,500mg
無水カフェイン	100mg
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩	75mg(赤玉丸剤)
添加物としてバレイショデンブン、コメデンブン(丸剤)、タール色素(丸剤)を含む	1包量(散剤850mg丸剤6粒)

用法・用量

15才以上(大人)	1回 1包宛(丸剤6粒)
11才以上15才未満	1回2/3包宛(丸剤4粒)
8才以上11才未満	1回1/2包宛(丸剤3粒)
5才以上 8才未満	1回1/3包宛(丸剤2粒)

1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

使用上の注意

- 服用に際しては、添付の「使用上の注意書」を必ずお読み下さい。
- 15才未満の水痘、インフルエンザの患者さんには投与しないで下さい。
- 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してせんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。
- 小児の手の届かない所に保管し、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 1包を分割したり、残りを使用する場合には、袋の口を折返し、2日以内に使用して下さい。又使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

2包入 ¥300+税

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



分包

かぜねつ一効散

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ✗

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 5歳未満の乳幼児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある)

4. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けること

5. 服用前後は飲酒をしないこと

6. 長期連用しないこと

相談すること 📝

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面もお読みください。)

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名前	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする。息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状が現れることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に満密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

富山薬品株式会社(お客様相談口) ☎ 076-435-0139

製造販売元 富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬175