



第2類医薬品

和漢薬強心剤

六神丸

薬師印

【効能又は効果】

動悸，息切れ，気付け

【用法及び用量】

大人(15才以上) 1回
…………… 2粒
1日2回朝夕に水又は
白湯にて服用する。

15歳未満の人は服用し
ないこと



沈香(シンコウ)



朝鮮人參
(ニンジン)



蟾酥(センソ)
(ヒキガエルの耳腺から
分泌する乳液)



牛黄(ゴオウ)
(牛の胆石)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の強心薬

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

【成分及び分量】 1日量(4粒)中

ゴオウ……………2.0mg	沈香末……………2.3mg
センソ……………5.0mg	牛胆……………3.0mg
ニンジン末……………2.2mg	d-ボルネオール……………1.0mg

添加物としてサリチル酸、寒梅粉、カルボキシメチルセルロースカルシウム、薬用炭を使用しています。

〈用法用量に関する注意〉

- (1) かまずに服用してください。
 - (2) 用法用量を厳守してください。
- ### 〈保管及び取り扱い上の注意〉
- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

有限会社 薬師製薬

〒930-0044 富山市中央通り3-1-15

電話 076-495-5995

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)