

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

## 皮膚疾患外用薬

# 外用 雪の元

本剤は皮膚を保護する作用のある酸化亜鉛、かゆみを抑えるジフェンヒドラミン、dl-カンフル、殺菌消毒作用のあるイソプロピルメチルフェノールなど、皮膚疾患に効果的な4種の有効成分を配合していますので、しっしん、ただれなど幅広い疾患に効果的です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 《効能・効果》

かゆみ、かぶれ、皮膚炎、じんましん、ただれ、しっしん、しもやけ、あせも、ひび

### 《用法・用量》

患部を清潔にしたのち、1日2~3回適量をすりこんでください。  
又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

### 《用法及び用量に関連する注意》


- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

### 《成分・分量》(100 g)中

成 分	分 量	は た ら き
酸化亜鉛	10.0 g	炎症、ただれを抑える
ジフェンヒドラミン	1.0 g	かゆみを抑える
イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	1.0 g	細菌を殺す
d1-カンフル	2.25g	かゆみを抑える
添加物として、d-ボルネオール、バレイシヨデンプン、ワセリン、パラフィン、香料を含有する。		

### 《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地  
株式会社 雪の元本店 お客様相談室  
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**

奈良県橿原市大谷町182番地

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。  
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地  
株式会社 雪の元本店 お客様相談室  
受付 9:00~12:00 TEL 0744-22-2440  
時間 13:00~17:00 FAX 0744-22-2406  
(土曜、日曜、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 **雪の元本店**  
奈良県橿原市大谷町182番地  
20g入

2005-MRS

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

TRADE MARK



抗ヒスタミン配合  
皮膚疾患外用薬



金 属 : 缶

相談すること

⚠ 使用上の注意

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

**効能・効果** かぶれ、じんましん、かゆみ、しっしん、ただれ、しもやけ、皮膚炎、あせも、ひび

**用法・用量** 患部を清潔にしたのち、1日2~3回適量をすりこんでください。又は、症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

**用法及び用量に関連する注意**

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

**成分・分量及びはたらき** 100g中

成分	分量	はたらき
酸化亜鉛	10.0g	炎症を鎮め、患部を保護
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを抑える
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用
dI-カンフル	2.25g	かゆみを抑える

添加物として、パレイシヨデンプン、ワセリン、パラフィン、d-ボルネオール、香料を含有する