

【第②類医薬品】販売名：ヘモスカット軟膏

【成分・分量】100g中

成分	分量	備 考
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.20g	炎症を抑え、痛み・かゆみを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	0.30g	痛み・かゆみを鎮めます。
フェニリン塩酸塩	0.15g	出血を抑えます。
ジエチルトリスリジン塩酸塩	0.50g	かゆみを鎮めます。
クロルヘキシリン塩酸塩	0.20g	細菌の感染をおさえ、患部の悪化を防ぎます。
トコエーリ酢酸エステル	1.00g	血行を改善し、止血を助けます。
アラントイン	0.80g	患部の組織を修復し、傷の治りを早めます。

添加物：サリシミツロウ、メチルパラベン、流動パラフィン、コレステロール

製薬販売元 ●お薬情報センター
株式会社 豊の元本店
奈良県橿原市大宮町 182 番地
電話：0744-22-2440
受付時間 9:00～12:00
13:00～17:00
(土、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【効能・効果】
それ痔（さげ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】
1日3回、適量を肛門部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】
1. 小児に使用される場合には、保護者の指導のもとに使用してください。
2. 肛門部にお使いください。

【使用に際して、箱の説明文を必ずお読みください。】

【注意】

1. 本人は使用しないでください。
1. 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシリンにアレルギー反応を起こしたことがある人。(2)
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入替えないでください。(使用の原因によって品質が変わります)
4. 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても品質保持のため、開封後はなるべく早く使用してください。

【保管及び取扱上の注意】

1. 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入替えないでください。(使用の原因によって品質が変わります)

4. 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても品質保持のため、開封後はなるべく早く使用してください。



外用痔疾用薬
ヘモスカット
軟膏
第②類医薬品

外用痔疾用薬
ヘモスカット
軟膏
ヒドロコルチゾン酢酸エステル
ジブカイン塩酸塩 配合




外用痔疾用薬
ヘモスカット 軟膏
外用痔疾用薬

外側の痔に
痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に
第②類医薬品

外側の痔に
痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に
第②類医薬品

開封口

2201-TYP



ご使用に際して、この箱の取明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起
こす可能性があります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤又は本剤の成分、クローキソシンによるアレルギー
性一症状を起したことがある人。

(2) 患部が腫れている人。

2. 長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください

(1) 医師の治療を受けたい人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬名とによりアレルギー一症状を起したことがある人。

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の
可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を
持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位

皮膚 発疹・発赤、かゆみ、はれ

その他 刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合
は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称

症状

使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、
腫れ、かゆみ、くしゃみ、のどのかゆみ、鼻息
が詰まる、しびれ、意識の障害等があらわれる。

3. 10日間使用しても症状がよくなり、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください