

1日1回 塗り

1日1回 注入

15歳以上

第②類医薬品 販売名：ヘモスカット注入軟膏

ご使用に際して、箱の説明文を必ずお読みください。

《成分・分量》 1個(2.5g)中

成分	分量	働き
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5.0mg	炎症を抑え、痛み・かゆみを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	7.5mg	痛み・かゆみを鎮めます。
ジフェニドラミン塩酸塩	12.5mg	かゆみを鎮めます。
エフェドリン塩酸塩	15.0mg	出血を抑えます。
アラントイン	20.0mg	患部の組織を修復し、傷の治りをはやめます。
トコフェロール酢酸エステル	25.0mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。

添加物：サラシツロウ、流動パラフィン、スクワラン、パラフィン、ワセリン

《効能・効果》 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

※注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

※寒い時期や低温で保管した場合、薬剤が硬くなる場合がありますが、手の中であたためると軟らかくなります。


製造番号

使用期限

《用法・用量》

●注入する場合 ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)	1個	1日1~2回
15才未満		使用しないこと




使用方法

①キャップを外し、すべりをよくするために薬剤をノズル先端部から少し出してください。

②ノズル部分を肛門内に挿入し、容器を押して薬剤をゆっくり注入し、押しのまま引き抜いてください。

●塗布する場合 次の量を患部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは注入には使用しないでください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)	適量	1日1~3回
15才未満		使用しないこと



使用方法

適量を患部にそのまま塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。

保管の際は、ティッシュペーパーなどでノズル先端部を拭き、キャップをしっかりしめて清潔に保ってください。

《用法・用量に関連する注意》

1. 肛門部におみ使用してください。
2. 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。

《注意》

1. 次の人は使用しないでください(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)患部が化膿している人。
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
3. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください
4. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。排尿困難(6)次の診断を受けた人。緑内障、高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害
5. 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元
株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

●お客様相談室
電話：0744-22-2440
受付：9:00~12:00
時間：13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

第②類医薬品

外用痔疾用薬

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

ヘモスカット
注入軟膏

内痔には
注入

外痔には
塗布

痔の痛み
はれ・出血に
かゆみ



2.5g×5個入

第②類医薬品

外用痔疾用薬

ヘモスカット
注入軟膏

内痔には
注入

外痔には
塗布

ヒドロコルチゾン酢酸エステル
ジブカイン塩酸塩 配合

2201-TYP

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

ヘモスカット 注入軟膏

外用痔疾用薬

第②類医薬品



ヘモスカット
注入軟膏
外用痔疾用薬

開封口

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に
第②類医薬品

ご使用に際して、
この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと重症の症状が重化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。

2. 本剤を使用している時は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
(かぜ薬・鎮咳去痰薬・鎮痛剤・内服薬等
抗ヒスタミン剤を含む内服薬等
酔い薬・アレルギー用薬等)

3. 使用後、薬物又は器械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください

5. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者

(4) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人、痔内腫、重血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

《保管及び取扱い上の注意》

1. 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管してください。

2. 15才未満の小児の手が届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。

5. 使用済みの容器等はトイレットに流さないでください。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、唇唇しびれ、動悸、眩暈の出現等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が疑われた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかき、眠気

4. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください