



ご使用に際して、この箱の説明書を  
必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**⚠ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**1. 次の人は使用しないでください**

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 患部が化膿している人。

**2. 長期連用しないでください**

**🗨️ 相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**《保管及び取扱い上の注意》**

1. 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、坐薬を開封せずに保管してください。(夏は冷蔵庫の中に保管してください。)

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても品質保持の点から、開封後はなるべく早く使用してください。